

Author(s)

{anonymous} {Hänle, G. F. (Ed.)}

Title

Ueber die Structur der weiblichen
Blüthen von Zea Maïs.

Abbreviated reference

Mag. Neuesten Erfahr. Pharm. 4(11): 118. [Nov.] 1823
(2)

Mag. Neuesten Erfahr. Pharm. 4(11): 118. 1823 [Nov.]

Notes

MLP 1708 A

Read by Gay and Brogniart in "Séances
für die Naturgeschichte, Paris", publ. in "Bull.
des sc. par la Soc. philom.", Febr. 1823 and
"Bull. gén. et univ. Nro. 6"Abstract in German of article by Brogniart in Bull. Sci. Soc. Philom.
Febr. 1823

W. KORRIG AUG 1969

Author(s)

{anon.} Hänle, Georg Friedrich (Ed.)

Title Ueber die Structur der weiblichen Blüthen von Zea Maïs.

Abbreviated reference

MLP ~~1708~~ 1708
Mag. Pharm. 4(2): 118. 1823. [Nov.]
Neuesten Erfahr.

Notes

in German

Abstract of an article out of "Bull. des sc. par la soc.
philom. Febr. 1823" by N. Ad. Brogniart and out of
"Bull. gén. et univ. Nro. 6."

MÖLLER FEB 1972

118

II. Pflanzenkunde.

Ueber die Structur der weiblichen Blüthen
von Zea Maïs.(Mon. ex. 20. Brogniart. — Bull. des sc. par la Soc.
philom., Febr. 1823.)

Hr. Gay hat in einer merkwürdigen gleichung,
die er in der Société f. b. Naturgeschichte in Paris ge-
lesen, und wovon ein Auszug in das Bulletin des Scien-
ces, März 1823, eingebracht wurde, über mehrere sehr
wichtige Punkte in Betreff der Structur der Maïsblü-
then Aufklärung gegeben; er hat gezeigt, daß die weib-
lichen, bisher als einblüthige beschriebene Stiefchen als
zweiblüthig, so wie die männlichen Stiefchen, betrach-
tet werden müssen, wovon aber eine Stiefche fast vor
der Zeit abfiel, oder sich nur sehr unvollkommen ent-
wickelte. Die von Hrn. S. Raguier vorgestellte Stief-
kiste zum Zweck einen eigenen und gemeinschaftlichen
Saft bekannt zu machen, wo nämlich eine weibliche
Stiefche von diesem Saft weiche Stiefchen trug, die
zweiblüthig, mehr oder wenig vollkommen entwickelt
und beide oft, Fernephylliden und fruchtbar waren.
(Bulletin, gén. et univ. Nro. 6.)

Chemische und medicinische Untersuchungen
über Crithmum maritimum.

(Sen. S. cavint. — Mém. dell' Acad. di Torino, tom. XXV.)

Aus dieser gleichung resultirt daß das Crithmum
maritimum einblüthig,