

In: 4848
22

29
102
BS

D. D.

**PLANTARUM
JAMAICENSIVM
PUGILLVS,**

QUEM
CONSENS. EXPERIENT. FAC. MEDICÆ
IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI,
PRÆSIDE

VIRO NOBILISSIMO ET EXPERIENTISSIMO
**DN. DOCT. CAROLO
LINNÆO,**

ÆQVIT. AURAT. DE STELLA POLARI,
S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MEDIC. ET BOTAN. PROFESSORE REG. & ORD.
ACADEM. SCIENT. UPSAL. HOLMIENS. PETROPOL.
BEROLIN. IMP. NAT. CUR. LONDIN. MONSPEL.
TOLOS. ET FLORENT. SOCIO,
h. t. RECTORE MAGNIFICO,
SPECIMINIS ACADEMICI LOCO,
PUBLICE EXAMINANDUM SISTIT

ALUMNVS REGIVS
GABRIEL ELMGREN,
SMOLANDVS.
IN AUDIT. CAR. MAJ. DIE XXVIII. NOVEMBR.
ANN. MDCCLIX.
H. A. M. S.

UPSALIÆ

12
Grofshandlaren i Stockholm,
Adel och Högagtad

Herr **MAGNUS QUAST
PETERSSON,**

Samt

Fabriqueuren
Adel och Högagtad

Herr **GUSTAV HINDRICH
BAUMGARDT,**

MINE HÖGTÅRADE K. MORBRÓDER.

Wett och Dygd med helgad ifwer,
Som åt Fosterlandet gifwer
Såker styrka, önskad frögd,
Som med Handel och Fabriker
Gör att Lyckan till off fiker
I vår bygd,
Bör af off ej nånsin glömas,
Nej, förtjänst bör rätt berömas,
Dertill är ju största skål.
Att jag härmed will beprifa
Godhet, som J mig tåcks wisa,
Tyden wål.

MINE HÖGTÅRADE K. MORBRÓDERS

Ödmjukaste tjänare,
GABRIEL ELMGREN.



PRÆFATIO.

Ubi vastissima simul ac pulcherrima plantarum variorum collectio, quam in insula Americæ Jamaica fecerat D. D. BROWNIUS, ad Museum N. D. PRÆSIDIS accesserat, hoc rei herbariæ insigne incrementum omnes studii Botanici cultores lætiori animo inspeximus, quod eo nos Flora ditare videbatur thesauro, qui omnium, quantumlibet acutissimorum Botanicorum oculos hæctenus latuerat. Ego vero, postquam ad ductum fili Ariadnæi, quod nobis præbet Tom. II. præstantissimi Operis Syst. Nat. edit. 10: mæ, qualemcunque in plantis vivis examinandis ac describendis facultatem acquisiveram, id a N. D. PRÆSIDE impetravi, ut delineando nonnullas plantas Jamaicensis periclitarer, quantum vires meæ in siccatis examinandis valerent. Jam expertus novi longe esse difficilius plantas exsiccatas quam vivas delineare; cum partes plantæ aridæ, optimas daturæ notas, sæpe adeo eva-

nuerint & exaruerint, ut pæne omnem nostram eludant perspicaciam; juxta vero cognovi, descriptiones maxime prolixas non semper ideam plantæ lectori sistere dilucidissimam; in primis si eæ negligentur notæ, quæ maximum adferunt lucis, partium loquor, in primis foliorum numerum, figuram, situm & proportionem, quippe quorum in delineatione plantæ cujusdam maxime habenda est ratio. Quocirca hoc observandum, quod in quibusdam ordinibus naturalibus situs foliorum adeo existat communis, ut nec hujus commemoratione sit opus: scilicet in Tetradynamia & Diadelphia folia sunt alterna, in Didynamia gymnospermia vero opposita. Ad scalam geometricam foliorum instituire mensuram, quamvis receptissimum sit, profecto tamen & risu & commiseratione dignum judico; cum mutato plantæ solo, ipsius & folia haud raro magnitudine mutantur. Proportio autem foliorum magis, licet non maxime, valet. In his descriptionibus præcisissimè ea tantum notavi, quæ visa fuerunt evidentiora. Et quoniam unica alterave nota, in planta obscuriore data, multum adfert Botanico in ea dignoscenda lucis; speraveram, me rem, nec prorsus ingratham, nec inutilem Rei herbariæ studiosis allaturam, dum breves has & compendiosissimas plurimum rarissimarum plantarum sisto descriptiones. Meos vero, C. L., ut eodem, quo aliorum soles, innoxios conatus excipias favore, etiam atque etiam rogo.

DIANDRIA.

1. **J**USTICIA *assurgens*; similis Just. *sexangulari*, sed Bractæ angustæ, acuminatæ.
2. **P**ASPALUM *distichum*. Culmus pedalis, tenuis. Folia angusta. Spicæ duæ: altera pedunculo brevior. Spicæ rachis membranacea, flexuosa, a pagina tantum exteriori instructa floribus sessilibus, alternis, imbricatis. Calyx & Corolla ovata, acuminata, nec orbiculata.
3. **P**IPER *verticillatum*. Saururus 8. Brown. jam. 204. Herba tenera, erecta, digitalis. Folia verticillata, 3, 4 s. 5, ovata, obtusa, succulenta, trinervia, integerrima, petiolata. Spicæ simplices, foliis multoties longiores.

TRIANDRIA.

4. **S**CHOENUS *secans*. Culmus triqueter marginibus denticulatis. Folia margine & carina aculeata. Panicula pubescens.
5. **C**YPERUS *ligularis*. Involucrum longissimum, quadripedale: foliolis margine & carina aculeis minutissimis. Umbellæ radii plures, triquetri, læves, longitudine inæquales. Spicæ plures, pedicellatæ, oblongæ, capitatæ, decussatim sæpe positæ cum capitellis ad earum basin. Capitula hæc congesta e spiculis subulatis, sessilibus, undique confertis.

6. SCIRPUS *mutatus* admodum similis *Scirpo articulato*, sed differt culmo triquetro, minime articulado.
7. PANICUM *hirtellum*. *Panicum* I. Brown. *jam.* 132. *Culmus* tenuis. *Folia* lata s. ovato-lanceolata. *Spica* composita ex *spiculis* 9 s. 10, alternis, sessilibus, erectis, remotis, secundis, rachi adpressis. *Flosculi* singulo denti gemini infidentes, subsessiles, extrorsum versi, pubescenti-canescentes. *Calycis* valvulæ 3, *arista* terminatæ: harum infima *arista* multoties longior s. longitudine totius *spiculæ*; reliquæ *aristæ* vix *flosculis* duplo longiores. *Rachis* partialis a tergo setis tenuibus scaber est.
8. PANICUM *grossarium*. *Culmus* bipedalis, interdum ramosus, compressus, lævis. *Folia* lato-lanceolata, europæis graminibus latiora. *Panicula* simplex. *Racemi* alterni, erecti, indivisi. *Flores* gemini: altero subsessili; altero pedicello longitudine floris prioris. *Calycis* foliolum extimum brevius; duo interiora obtuse mucronata.
9. PANICUM *divaricatum*. *Culmus* altus, rigidus, filiformis, lævis. *Rami* divaricatissimi, horizontales, subramosi. *Folia* lineari-lanceolata. *Panicula* depauperata, brevis, subsimplex: pedicellis bifidis: altero longiore. *Calycis* valvula exterior est superior & latior quam longa, ut reliquæ *mutica*. *Flores* quadruplo majores, quam in *Panico dichotomo*.
10. MILIUM *punctatum*. *Paniculæ* rami simplices, alter-

alterni, erecti, subvillosi. Flores gemini, extrorsum versi. Pedicelli brevissimi, basi annulo fusco cincti: altero brevissimo. Calyx pubescens. *Semina* glaberrima.

11. AGROSTIS *cruciata*. *Andropogon* 5. *Brown. jam.* 365.
12. AGROSTIS *radiata*. *Gramen*. 3. *Brown. jam.* 137. Simillima *Agr. cruciatae*, sed triplo major. *Spicae* plures quam quatuor, & intra divisuram, ubi a se invicem dehiscunt, villosae. Flores cum *A. cruciata* structura conveniunt.
13. POA *ciliaris*. *Briza* 1. *Brown. jam.* 135. *Culmus* filiformis, angustus, ramosus. *Folia* angustolinearia. *Panicula* pedunculata, glomerata. *Spiculae* ovatae: flosculis apice minus approximatis. *Calycis* valvulae subsubulatae. Flores obtusi, vix manifeste recurvati: valvula interior pilis albis, longitudine calycis, pulchre ciliata.
14. CYNOSURUS *virgatus*. *Gramen* 7. *Brown. jam.* 137. *Gramen* erectum. *Panicula* longa, subfastigiata, verticillata pedunculis simplicissimis. Flores alterni, sessiles, compressi. Calyces 5 s. 6-flori: valvulis acuminatis, compressis, carina scabris. Flosculi duo infimi terminati arista brevissima; ultimus flosculus minimus, staminibus pistillisque destitutus.
15. ARISTIDA *americana*. *Gramen* Festucam referens. *Culmus* ramosus. Differt ab *Aristida ascensionis* quod radii paniculae sint indivisi: Spiculis alternis e flosculis sessilibus, quorum valvula calycina purpurascens est.

TETRANDRIA.

16. IXORA *americana*. Arbor. *Folia* terna, longe petiolata, lanceolato-ovata, glabra, integerrima. *Stipula* singulis petiolis interjecta. *Corollæ* Tubus & Limbus multo brevior, quam in reliquis Ixoris.
17. FAGARA *Pterota*. Schæenus *Fagara* Sp. pl. 389. Frutex *ramis* rugosis. *Folia* alterna, pinnata, trijuga: petiolo communi marginato, articulato: *Foliola* obovata, integerrima, emarginata, glabra. *Spicæ* axillares, sessiles, geminæ.
19. RHACOMA *Crossopetalum*. Suffrutex statura Veronicæ. *Rami* dichotomi, pubescentes. *Folia* opposita, subpetiolata, ovata, mucronata, tenuissime acute serrata, subpubescentia. *Pedunculi* axillares, filiformes, pilosi. *Umbella* composita, 2 f. 4-chotoma, longitudine foliorum. *Pedicelli* capillares; *involucra* minima.
19. BUDDLEJA *americana*. *Caulis* tomentosus. *Folia* Verbasci, serrata, opposita. *Racemi* terminales, oppositi, recti.
20. ISNARDIA *palustris*. Oldenlandia 2. Brown. *jam.* 146.

PENTANDRIA.

21. HELIOTROPIUM *fruticosum*. Brown. *jam.* 151. n. 4. Frutex durus, parvus, vix spithamæus.
22. HELIOTROPIUM *gnaphalodes*. Heliotr. arbo-
reum *maritimum* tomentosum Sloan. *jam.* 93. *hist.*
1. p. 213. Frutex altitudine humana. *Folia* confer-
ta,

ta, linearia f. linearilanceolata, obtusiuscula, integerrima, subcarnosa, albo-tomentosa, uti etiam ramuli. *Pedunculi* axillares, foliis longiores, sæpe foliis duobus instructi, apice bifidi, singulo ramulo bifido, terminato *Spica* recurva, tomentoso-alba.

23. VARRONIA *lineata*. *Frutex* ramis subpilosis. *Folia* alterna, remota, lanceolata, acuminata, nonnullis crenis ferrata, scabra, subtus tomentosa, nutantia, petiolata: *petiolo* brevissimo, articulado. *Capitula* subrotunda, solitaria, axillaria foliorum: *pedunculus* rectus, nudus, patens, subvillosus, folio brevior, basi petioli sua basi adnatus, cum rudimento ramuli inter pedunculum & petiolum; dumque petiolus pedunculusque connatus decidit supra basin, remanet rudimentum spiniforme.

24. VARRONIA *bullata*. *Folia* lanceolato-ovata, ferrata, venosa, scabra, alterna. *Pedunculi* e ramificatione caulis, longi, recti, capitati.

25. IPOMOEA *verticillata*. *Convolvulus* 6. *Brown*. 153. *Caulis* & *Folia* levissime tomentosa. *Pedunculi* bifidi, multiflori, foliis breviores. *Calyces* glabri.

26. PSYCOTHRIA *asiatica*. *Folia* opposita, petiolata, lanceolata, integerrima, nuda. *Thyrsi* brachiati, e dichotomia caulis, foliis breviores.

27. RHAMNUS *Sarcomphalus*. *Brown. jam.* 179. *Folia* majuscula, rigidula. *Corymbi* axillares, breves, rigiduli.

28. RHAMNUS *Micranthus*. Plum. ic. 206. f. 1. Folia alterna, petiolata, palmaria.
29. EHRETIA *tinifolia*. Ceraso affinis. Sloan. jam. 169. hist. 2. p. 94. t. 203. f. 1. Raj. dendr. 45. Arbor facie Viburni Tini. Folia alterna, oblongo-ovata, integerrima, glabra, subvenosa. Panicula corymbosa, terminalis, longitudine foliorum.
30. CORDIA *Bourreria*. Jasminum. Sloan. jam. 169. hist. 2. p. 96. t. 204. f. 1. Raj. dendr. 69. Arbor. Folia alterna, petiolata, obovata, obtusa, integerrima, nuda, scabriuscula, subtus tomentosa. Panicula terminalis; corymbosa. Calyx obovatus, semi-5fidus.
31. TABERNÆMONTANA *Echites*. Brown. jam. 182. Caulis volubilis, teres. Folia opposita, petiolata, patentia, oblongiuscula, cordata s. ovata, integerrima, acuminata, utrinque glabra, subtus venosa. Rami alterni. Flores magnitudine Nerii, subumbellati. Semina papposa.
32. RHUS *Metopium*. Terebinthus maxima. Sloan. jam. 167. hist. 2. p. 90. t. 199. Raj. dendr. 51. Calyx monophyllus, cyathiformis. Petala calycis parieti inserta. Baccæ sicca: Semine unico, bilobo, arillato.
33. RHUS *Cominia*. Brown. jam. 205. Ramuli, Petioli, Pedunculi subpubescentes. Spicæ uno alterove ramo divisæ.
34. TURNERA *pumilea*. Pumilea 1. Brown. jam. 188. Planta pusilla, vix pollicaris. Caulis simplicissimus, albo pilosus. Folia alterna, petiolata, lan-

lanceolata, pilis raris adspersa, semipinnatifida: ferraturis profundis, integris, acutis, utrinque 5. f. 6. *Glandula* ad basin petiolorum nulla. *Flos* petiolo ipso insidet, *Bracteis* duabus, linearibus, minutissimis, pilosis instructus.

35. *ARALIA arborea*. *Brown. jam. 189.* Arbuscula. *Folia* alterna, petiolata, lanceolato-ovata, integerrima. *Pedunculus communis*, a casu pedicellorum deciduorum, *Bracteis* spinosis quasi dentatus. *Umbella* composita: *Radii* umbellæ universalis, in medio, *glandula* notati: *umbellulae* breves, regulares. *Bacca* pentagona, 5-cocca, sed singuli anguli biloculares. *Calyx* superus. *Stylis* 5. *Hedera arbor folio hastato. Plum. spec. 18.*

HEXANDRIA.

36. *HYPOXIS decumbens*. *Ornithogalum. Brown. jam. 195.* *Bracteæ* ad exortum pedunculorum lanceolatæ, pedicellis longiores sunt.

37. *LORANTHUS americanus*. *Modus crescendi & habitus visci. Rami erectiusculi. Folia* lanceolato-ovata. *Spicæ* oppositæ, compositæ, quasi ramosæ.

38. *LORANTHUS occidentalis. Scurrula 2. Brown. jam. 197.* *Statura prioris. Rami* divaricati. *Folia* ovata. *Spicæ* oppositæ, laterales, simplices.

OCTANDRIA.

39. *RHEXIA Acisanthera. Caules* lignosi, virgati. *Rami Ramulique* alterni, acute tetragoni. *Folia* opposita, subpetiolata, oblongo-ovata, ar-

gute ferrata, nuda. Flores axillares, solitarii, pedunculati pedunculo floribus brevioribus. At *Rhynchospora virginiana* Folia lanceolata, hispida & Pedunculi terminales trichotomi.

40. COCCOLOBA *tenuifolia*. Recedit a congenere: *Foliis* membranaceis, nec coriaceis. *Petiolis* cinctis membrana loco stipulae, nec exeunte de eorum dorso. *Racemis* terminalibus, simplicissimis. *Floribus* sparsis e singulis punctis, pedicellatis.

DECANDRIA.

41. CASSIA *viminea*. Cassia 8. Brown. *jam.* 223. *Frutex* ramis vix tomentosis. *Folia* bijuga: *Foliola* ovato-oblonga, acuminata, nuda: superiora majora. *Glandula* ovato-oblonga inter infimum par. *Petiolus* desinens in setam filiformem, brevissimam. Sub petiolo in caule provenit *squama* callosa, obsolete tridentata. *Racemi* ex alis foliorum.
42. CASSIA *biflora*. Cassia 6. Brown. *jam.* 223. *Plum.* ic. 78. f. 1. Statura *Orobi nigri*. *Folia* sexjuga. *Foliola* ovali-oblonga: exterioribus paulo majoribus, glabra, obtusa, mucrone setaceo minimo. *Flores* lutei. *Siliquae* lineares, compositae.
43. BUCIDA *Buceras*. Habitat ad ripas fluviorum. *Folia* ad ramorum tantum sumitates, conferta, petiolata, obovata, integerrima, glabra. *Spicae* plures, pedunculatae.
44. ERYTHROXYLON *areolatum*. *Arbor* ramis super-

superficie inæqualibus. *Folia* alterna, ovalia s. ob-
ovata, obtusa, lævia, subtus areola aliter venosa.
Stipula oblongiuscula marginis instar per ramum
oblique decurrens & fere amplexans; cujus dor-
so *Petiolus* est inarticulatus, qui decidens relin-
quit basin tuberculum constituentem. *Pedunculi*
e gemma axillari, plures, simplices, uniflori, pe-
tiolis paulo longiores, filiformes, superne sen-
sim crassiores.

ICOSANDRIA.

45. MYRTUS *Zuzygium*. *Rami* dichotomi, albi-
di. *Pedunculi* oppositi, multiflori, ad ultimam
dichotomiam ramorum. *Folia* ovata, utrinque
acutiuscula, glabra, bina, apices ramorum ter-
minantia.
46. MYRTUS *Chytraculia*. *Brown. jam. 239*. Si-
millima præcedenti: *Ramis* dichotomis, *Foliis*-
que duobus terminalibus; diversa *floribus* copio-
sioribus, *ramis petiolis pedunculisque* tomento
s. pube ferruginea (teste Brownio) vestitis, quam
deposuit.
47. MYRTUS *biflora*. *Folia* integerrima. *Pedun-*
culi axillares, solitarii, alterni. *Umbella* biflora:
involucro minimo.

POLYANDRIA.

48. CAPPARIS *ferruginea*. *Rami* ferruginei, sca-
briusculi. *Folia* lanceolata, petiolata, integerr-
ima. *Pedunculi* umbellati. *Umbella* simplex. *Ger-*
mina obovata, stipiti infidentia.

49. MORISONIA *flexuosa* (an americana?) Folia simillima *Capparidi Breyniæ*, sed angustiora, nutantia, coriacea, petiolata. Rami teretes, flexuosi. Pedunculi multiflori, breves, teretes. Pedicelli basi inarticulati. Stipes fructus longissimus f. longitudine foliorum.
50. MENTZELIA *aspera*. Planta tota adpersa fetis apice pentaglochidibus.
51. CORCHORUS *Coreta capsulis linearibus teretibus, foliis subcoriatis serratis: infima serratura setacea. Coreta Brown. jam. 147.* distincta a *Corchoro siliquoso* Foliis latis nec lanceolatis, sed infima serratura setacea ut in *Corch. olitorio*.
52. CLEMATIS *dioica*. Planta scandens. Folia ternata: foliola petiolata, integerrima, 3 f. 5-nervia. Flores paniculati. Calyx pubescens. Stamina filiformia. Semina cauda villosa. Flores masculi in alio, fructus in alio specimine observantur, hinc monoica aut dioica erit.

DIDYNAMIA.

53. SATUREJA *viminea. Sideritis viminea. Brown. jam. 258.* Caules tetragoni: angulis in senescente caule deciduis. Folia lanceolato-obovata, integerrima, lineata, interdum subtus tomentosa, interdum glabra. Flores parvi, in brevissimo pedunculo, terni. Involucra universalialia partialiaque diphylla, setacea, calyce breviora. Calyces decem striis exarati, terminati dentibus 5, acuminatis, subæqualibus. Corollæ labium superius emar-

marginatum; inferius trifidum: media lacinia
 majore. *Stamina* distantia.

54. *BALLOTA suaveolens*. *Mesosphærum*. *Brown.*
jam. 257.

55. *CAPRARIA durantifolia*. *Phælypea*. *Brown.*
jam. 269. Habitat in *Jamaicæ* inundatis. *Caulis*
 pedalis, obtuse sexangularis. *Folia* opposita s. ter-
 na s. quaterna, sessilia, lanceolata, serrata, ba-
 sin versus integerrima, ipsa basi dentata. *Rami*
 alterni, caule breviores, simplices. *Flores* axil-
 lares. *Pedunculi* solitarii, longitudine floris. *Ca-*
lyx 5-partibus: *Foliolis* lanceolatis, acuminatis.
Corolla ringens: *Tubus* longitudine calycis. *Lab.*
 superius erectum, latius, emarginatum; *Lab.* in-
 ferius 3-partitum, æquale. *Stam.* didyma, lon-
 gitudine tubi. *Stigma* obtusum, bilobum. *Capsu-*
la ovata, acuta, bilocularis, dissepimento con-
 trario. *Semina* plurima, subrotunda.

56. *STEMODIA maritima*. *Herbæ* *Caulis* tetrago-
 nus, pubescens. *Rami* alterni, erecti, caule bre-
 viores. *Folia* opposita, lanceolata, sessilia, semi-
 amplexicaulia, erecta, subpubescentia, argute
 serrata. *Flores* axillares, solitarii, sessiles intra
 foliola duo lateralia.

57. *GESNERIA acaulis*. *Caules* terræ adpressi in
 rupibus. *Folia* ad ramorum apices, conferta,
 subpetiolata, palmaria, lanceolato-ovata, scabra,
 subtus venosa. *Pedunculi* communes, ad basin fe-
 re divisi. *Flores* brevissimi, conferti, pedunculati.
Calyx urceolatus, ultra medium divisus in laci-
 nias ensiformes. 58.

58. **RUELLIA** *Blechnum*. *Brown. jam. 261.* *Caulis* herbaceus, obtuse tetragonus. *Folia* ovato-oblonga, acuminata, integerrima, petiolata. *Spicæ* terminales, magnitudine & fere figura Humuli, ex bracteis lato-ovatis: inferioribus acuminatis; superioribus obtusiusculis, imbricatis, calyce longioribus, flore paulo brevioribus.
59. **ELLISIA** *acuta*. Fruticulus *ramis* compressis, tetragonis. *Folia* opposita, subpetiolata, lanceolato-ovata, argute serrata, glabra, mucronata. *Spinæ* oppositæ, horizontales, supra folia & ramorum rudimenta, adeoque pedunculorum rudimenta. *Racemi* ex alis foliorum superiorum, solitarii, simplices, foliis longiores. *Flores* nutantes.

MONADELPHIA.

60. **MELOCHIA** *tomentosa*. *Melochia frutescens*. *Brown. jam. 276.* Capsulæ structura omnino *Melochiæ pyramidatæ*, at pyramidatæ Herba tenerior & glabra, hæc vero tota tomentosa, etiam capsulis & *Flores* multo majores.
61. **LAVATERA** *americana*. *Caulis* frutescens, tomentosus, uti tota planta. *Folia* petiolata, oblongo-cordata, acute crenata s. denticulata, acuminata, nervosa, utrinque tomentosa, subtus pallidiora. *Stipulæ* lanceolatæ, deciduæ. *Pedunculi* axillares, solitarii, uniflori, erecti, longitudine petioli. *Ramulus* etiam floriferus ex eadem ala folii. *Calyx* exterior major: foliolis cordatis, coadunatis, lævissime tomentosus.

62. MAL-

62. MALVA *spicata*. *Caulis* villosus, tomentosus. *Folia* petiolata, cordata, tomentosa, subtus magis tomentosa, venosa, crenata, absque angulis. *Stipulae* subulatae, deciduae. *Spicae* plurimae, digitales, axillares, solitariae, pedunculatae; ad apices vero caulis plures, congestae, sessiles: terminali adhuc longiore. *Flores* sessiles. *Calyces* hirti, interiore latere colorati.

63. SIDA *ciliaris*. *Malva* 2. *Brown. jam. 282*. *Statura* *Sidae spinosae*. *Caulis* filiformis, decumbens, rarius ramosus, scaber adpressis strigis. *Folia* petiolata, ovalia, retusa, ferrata, glabra, subtus scabra stellis setaceis, sparsis. *Stipulae* lineares, ciliatae, petiolo longiores. *Pedunculi* solitarii, axillares, uniflori, breves. *Calyx* 5fidus. *Semina* saepius octo, dorso muricata.

64. SIDA *jamaicensis*. *Sida* 5. *Brown. jam. 280*. *Herba* annua. *Caulis* pedalis, subtomentosus. *Folia* petiolata, ovata, ferrata, supra subtomentosa, subtus tomentosa. *Flores* axillares, nonnulli, pedunculis brevissimis, rarius ramulo elevati. *Semina* 5, dorso gibba, apice dibentata.

65. SIDA *umbellata*. *Sida* 11. *Brown. jam. 281*. *Folia* cordata, obtuse ferrata, obsolete tomentosa, superiora utrinque angulo minimo lobata. *Pedunculi* solitarii, bifidi s. trifidi s. quadrifidi, omnino umbellati. *Capsulae* 5, apice bidentatae.

66. SIDA *paniculata*. *Sida* 8. *Brown. jam. 280*. *Statura* *Sidae periplocifoliae*. *Caulis* simplex, tenuis, teres, pubescens, bipedalis superne parum ramosus

fus paniculatusque. *Folia* cordata, oblonga, sensim acuminata, inæqualiter ferrata, trinervia, subtus tomentosa & venosa. *Petioli* brevissimi, tomentosi. *Stipulæ* subulatæ, petiolis longiores. *Pedunculi* capillares, foliis multoties longiores, recti, communiter bini: altero simplici unifloro; altero longiore ramoso aliquot floribus; geniculum pedunculi spatio a calyce remotum. *Stamina* plura. *Pistilla* 5.

67. *SIDA viscosa*. *Sida* 2. *Brown. jam. 280.* *Caulis* *Pedunculi* & *Petioli* pilosi ac tomentosi. *Folia* profunde cordata, crenata, venosa, utrinque tomentosa, rarissime utrinque angulata. *Petioli* longitudine foliorum. *Stipulæ* lineares, longiusculæ, patentés. *Pedunculi* simplices, uniflori, longitudine fere foliorum, versus flores geniculati, solitarii, rarissime bini. *Calyx* capsulis brevior. *Capsula* subrotunda, depressa, obtuse 5gona, 5locularis, levissime tomentosa. *Semina* solitaria.

68. *SIDA urens*. *Sida* 6. *Brown. jam. 280.* *Caulis* angustus, altus, herbaceus, hirtus uti petioli folia pedunculi & calyces. *Folia* cordata, acuminata, ferrata, utrinque hirta. *Calyces* pyramidati, in pedunculis lateralibus nonnulli, ad apicem vero plantæ fere in spicam glomerati.

DIADELPHIA.

69. *POLYGALA paniculata*. *Caulis* pedalis, filiformis, erectus, superne ramoso-paniculatus. *Folia*

lia alterna, linearia, vix lanceolata, acuta, glabra. *Racemi* longi, laterales & terminales: *Braçteæ* planæ, deciduæ. *Corollarum Alæ* purpurascens. *Capsulæ* oblongæ, compressæ, vix emarginatæ.

70. DOLICHOS *filiformis*. *Caules* filiformes, volubiles, vix manifeste pubescentes. *Folia* ternata, linearia, obtusa, mucronata, setata vix conspicue, longitudine unguis, latitudine lineæ unguis: intermedio duplo longiore.

71. DOLICHOS *repens*. tota planta pubescens.

72. ORNITHOPUS *tetraphyllus*. *Herbæ Caulis* erectus, nudus, adpersus pilis vix manifestis. *Folia* alterna, petiolata, remota, quaterna: *Foliola* obovata, oblongiuscula, emarginata, integerrima, lævia, subæqualia. *Petiolus* communis canaliculatus, brevis. *Partiales* brevissimi vixque manifesti. *Pedunculi* axillares, solitarii, uniflori, nudi, petiolis longiores, terminati *Braçteis* 2, ovali-oblongis, deciduis, inter quas flos sessilis. *Legumen* rectum, teres, braçteis quadruplo longius, articulatum: articulis subrotundis, 10 pluribusve. Tota facie a congeneribus differt.

73. GALEGA *cinerea*. *Caulis* rectus, nec flexuosus, debilis, teres. *Folia* pinnata cum impari, 3juga s. 5juga. *Foliola* lineari-lanceolata, obtusiuscula, interdum emarginata, semper mucronata, ad angulum acutum striata, subtus villosa. *cinerea*. *Stipulæ* subulatæ. *Racemi* oppositifolii, longi, erecti. *Flores* solitarii s. gemini, pedicel-

- lati. *Legumina* linearia, recta, divergentia, vix pendula, piloso-cinerea.
74. HEDYSARUM *Ecastaphyllum*. Simillimum *Hedysaro gangetico*, sed diversum petiolis ad apicem destitutis istis stipulis duabus fetaceis.
75. HEDYSARUM *barbatum*. *Caules* prostrati, longi, villosi. *Folia* ternata: *Foliola* ovato-oblonga, subtus tomentosa. *Petioles* pilosi. *Stipulae* membranaceae, ensiformes, apice subfetaceae. *Racemi* axillares & terminales, solitarii, recti, longitudine foliorum. *Bracteae* membranaceae, cymbiformes, nudae, acuminatae, longitudine pedicellorum: *Pedicelli* gemini, uniflori. *Calyces* femisfidi, pilis longis barbati, mox a florescentia recurvati. *Corolla* vix calycum longitudine. *Legumina* biarticulata, compresso-membranacea.
76. HEDYSARUM *hamatum*. *Trifolium*. *Brown. jam. 298. Ononis Sloan. jam. t. 119. f. 2.* *Caules* herbacei, glabriusculi: *Ramis* elongatis, alternis, decumbentibus. *Folia* ternata, lanceolata, saepius integerrima, nuda, oblique nervosa. *Stipulae* membranaceae, amplexantes, apice utrinque fetaceo. *Florum capitula* terminalia, demum lateralialia, sessilia, foliosa: *Bracteis* imbricatis, pubescentibus, bifidis, terminatis foliolo simplici, minimo, mucronato. *Flores* sessiles intra bracteas *Legumina* carinata, lateribus angulata, biarticulata: articulo exteriori terminato *Arista* subulata, recurvo-hamata, extra spicam eminente. *a Viscosa* varietas. *Trifolium. 2. Brown. jam. 299. Sloan.*

Sloan. jam. t. 119. f. 1. Burm. zeyl. t. 106. f. 2.
differt tota planta pubescente-viscosa *Folia* magis
ovata, vix nervosa, ciliata.

SYNGENESIA.

77. CHRYSOCOMA *scoparia*. Fruticis *Cauliculus*
hexagonus: *Ramis* alternis, numerosissimis, con-
fertis in modum *Genistæ scopariæ*. *Folia* alterna,
sublanceolata, integerrima, glabra, minima.
Flores terminales, solitarii, minimi.
78. SANTOLINA *Amellus*. Statura *Eupatorii*.
Folia opposita, petiolata, ovato-lanceolata, læ-
via. *Paniculæ* terminales, paucifoliæ, brachia-
tæ. *Calyx* corolla dimidio brevior, subimbrica-
tus. *Paleæ* longitudine florum. *Semina* tetra-
gona, absque pappo.
79. SANTOLINA *jamaicensis*. *Caules* fruticosi,
angusti, teretes, obsolete tomentosi. *Folia* o-
vato-oblonga, scabra, trinervia. *Flores* termi-
nales, sæpe terni: propriis pedicellis longitudine
florum. *Calyx* imbricatus, coloratus. *Corolla*
sangvineo-lutea. Statura *Chrysocomæ*, sed *Paleæ*
coloratæ, longitudine calycis. *Semina* Pappo
coronata.
80. SANTOLINA *oppositifolia*. *Caulis* rigidiuscu-
lus, simplex, erectus, angustus, striatus, pube-
scens. *Folia* opposita s. terna, subpetiolata, lan-
ceolata, integra, triplinervia. *Pedunculi* ex fo-
liorum ultimorum & penultimorum alis, longi,
apice diphylli, terminati *Spicis* albis, ovatis, sub-
sessili

- sessilibus, congestis. *Semina* nuda. *Paleæ* intermediae longiores.
81. EUPATORIUM *hastatum*. Scandens uti *Eupat scandens* & *Houstonis*, sed *Folia* triangulato-hastata, basi cordata, acuminata, nuda nec villosa. *Flores* in spicis brachiatis, nec in corymbis minimis. *Calyces* 5-flori.
82. EUPATORIUM *odoratum*. 2. *Brown. jam. 313*. *Caulis* rectus, tomentosus. *Folia* opposita, petiolata, deltoidea, lateribus transversa, basi prominentia. margine inferiore angulis obtusis crassis serrata. *Flores* fastigiati.
83. EUPATORIUM *ivifolium*. Similis *Eupat. hysopifolio*, sed *Folia* magis profunde trinervia, opposita, marginibus una alterave crena serrata. *Calyces* subsquarrosi, ultra 17-flori, *Stylis* longioribus.
84. BIDENS *apiifolia*. *Folia* radicalia prima obovata, inciso-serrata; reliqua trifida, incisa. *Scapi* radicales, digiti longitudine, nudi, in medio bractea lineari instructi, uniflori. *Caules* repentes, filiformes. *Folia* caulina alterna aut opposita, tripartita, incisa. *Pedunculi* uniflori. *Calyx* calyculatus: interiore colorato.
85. GNAPHALIUM *virgatum*. *Caulis* erectus, strictus, bipedalis. *Folia* alterna, remota, sessilia, decurrentia, lanceolata, obsolete serrata, subtus tomentosa, laxa. *Rami* e singulis alis, terminati *Spicis* longis, virgatis, simplicibus, interruptis, ex floribus sparsis: superioribus solitariis;

- tariis; inferioribus 2, 3, 4 congestis. *Calyces* imbricati squamis acuminatis, cinereis. *Pappus* longissimus.
86. *CONYZA odorata* 1. *Brown. jam. 318.* Flores facie *Gnaphalii*, simillimi *Conyzae cinereae*, destituti etiam flosculis femineis.
87. *CONYZA arborescens.* *Conyza fruticosa flore pallido-purpureo.* *Sloan. jam. 1. p. 257. Eupatorium 1. Brown. jam. 313.*
88. *ERIGERON jamaicense.* *Senecio 1. Brown. jam. 320.* Planta perennis. *Folia* radicalia fere *Bellidis*, lanceolato-cuneiformia, longius petiolata, utrinque scabra, superne serraturis utrinque duabus. *Caulis* digiti altitudine, filiformis, pilosus. *Folia* caulina circiter tria, radicalibus similia: summo angustiore integerrimo. *Flores* statura *Erigeri canadensis*, duo s. tres, subterminales, pedunculati.
89. *TUSSILAGO nutans.* *Leontodon 1. Brown. jam. 310. Dens leonis fol. subtus incano. Sloan. jam. 1. p. 255. t. 150. f. 2.* *Folia* lyrata, denticulata, lobis apiceque obtusa, subtus albo-tomentosa. *Scapus* simplicissimus, absque bracteis, tomentosus. *Flos* nutans: *Calyx* squamis acutis. Differt a *Tussil.* *Anandria* quod folia apice non acuta; quod *Scapus* absque bracteis; quod *Calycis* squamæ non obtusæ; quodque *Flos* nutans.
90. *INULA Trixis.* *Caulis* frutescens. *Folia* alterna, petiolata, lanceolato-ovata, nuda, vix subtus tomentosa, dentata; floralia vero integerrima.

- rima. *Flores* ramulorum terminales, pauci. *Calyx* exterior tetraphyllus: foliolis lanceolatis, erectis, longitudine calycis interioris. *Cal.* interior octophyllus: foliolis æqualibus. *Corolla* lutea, radiata, sed singularis. *Corollulæ* omnes monopetalæ, bipartitæ: labio exteriore latiore, patulo, tridentato; interiore bipartito; *Corollulæ* hæ omnes conformes, sed majores in radio. *Statura Conyzæ*, cui etiam antheræ longius caudatæ.
91. **AMELLUS** *umbellatus*. *Caulis* tomentosus. *Folia* opposita, palmaria, lanceolato-ovata, tripplinervia, denticulato-ferrata, venosa, albido-tomentosa, supra lanuginem exuentia. *Umbella* terminalis: pedicellis longis: inferioribus sæpe umbellulatis. *Calyx* imbricatus squamis acutis, arctis.
92. **COTULA** *Verbesina*. *Tanacetum* 1. *Brown. jam.* 316. *Caulis* herbaceus. *Folia* cordata, rarius ovata, obtusa, petiolata, grosse ferrata. *Pedunculi* terminales, longi, sæpius bifidi & biflori. *Facies* *Verbesinæ*.
93. **PECTIS** *ciliaris*. *Herba* annua. *Caulis* erectus, vix spithamæus, dichotomus, passim nudus. *Folia* opposita, linearia, acutiuscula, basi ad medium ciliata fetis remotis, subtus punctata, glabra. *Flores* axillares, sessiles. *Corollæ* luteæ, parvæ. *Semina* disci coronata fetis 5, basi membranaceis; *Sem.* radii coronata fetis 2.
94. **PECTIS** *linifolia*. *Tagetes* 2. *Brown. jam.* 319. *Radix* annua. *Caulis* sesquipedalis, brachiatus: ramis

- ramis oppositis, dichotomis, patentissimis. *Folia* opposita, linearia, subpetiolata, acuta, patentia, lævia, *Ramuli* ultimi dichotomi in pedunculos filiformes, uniflores. *Flosculi* disci 3; radii 5. *Semina* disci aristis 2; radii aristis 3, patulis.
95. COREOPSIS *reptans*. *Verbesina* 2. *Brown. jam.* 319. *Caules* longi, repentes. *Folia* opposita, petiolata, ovata, profunde ferrata, nuda sed rarissimis pilis adspersa: inferiora simplicia; superiora ternata. *Rami* ex alis alternis, erecti.
96. SILPHIUM *trilobatum*. *Bupthalmum*. *Brown. jam.* 321. *Chrysanthemum repens*. *Sloan. hist.* 1. t. 155. f. 1. *Morif. hist.* 3. p. 23. *Raj. suppl.* 210. *Herbæ Folia* opposita, sessilia, cuneiformia, subserata, acutiuscula, triloba: intermedio duplo majore.
97. LOBELIA *assurgens*. *Herbæ Folia* pedalia, latius lanceolata, ferrata, basi dentata: dentibus longis, patentibus.

GYNANDRIA.

98. ORCHIS *habenaria*. *Caulis* pedalis. *Folia* ovato-oblonga, 10 vel ultra, sensim minora. *Bracteæ* ovatæ, acuminatæ, germinibus breviores. *Germina* pollicaria. *Petala* 3 superiora conniventia, subcrenata; lateralia 2 ovato-oblonga, patula. *Labium* tripartitum: intermedia lineari, petalis paulo longiore; lateralibus duplo longioribus. *Cornu* filiforme, dependens, petalis 10plo longius.
99. SATYRIUM *plantagineum*. *Caulis* spithamæus.
- D *Folia*

Folia petiolata, ovato-oblonga, nervosa; *petioli* inferne vaginantes, latiores. *Corollæ* petala lateralibus 2 patula. Labium oblongum, integrum. *Calcar* obovatum.

100. PASSIFLORA *normalis*. *Folia* tenera, basi cordata, trilobata: Lobo intermedio rectangulo, obsoleto, setula terminato; Lateralibus divaricatis, elongatis, linearibus, obtusis, subtus punctatis.
101. ARUM *auritum*. *Arum* 2. *Brown. jam. 331.*
Sloan. jam. 1. p. 169.
102. ARUM *lingulatum*. 12. *Brown. jam. 333.*

MONOECIA.

103. OLYRA *latifolia*. *Culmus* altus, articulatus, vaginis foliorum vestitus. *Folia* sessilia, ovata, omnium latissima, acuminata. *Panicula* simplex. *Flores* laterales numerosi, masculi: terminalis femineus, solitarius; pedicelli sursum incrassati.
104. OMPHALEA *triandra*. Fruticis *Folia* alterna, petiolata, palmaria, lanceolato-ovata, obtusa, integerrima, nuda. *Pedunculi* axillares, terni, uniflori, nudi, longitudine petiolorum.
105. TRAGIA *Mercurialis*. *Caules* plurimi, diffusi, filiformes. *Folia* petiolata, cordato-ovata, serrata, obtusa, nuda. *Spicæ* sæpe 2, ad apices ramorum. *Bractææ* ovatae, acute dentatae s. subpalmatae. *Flores* masculi superiores plurimi; feminei inferius pauci, in eisdem spicis.
106. URTICA *grandifolia* 6. *Brown. jam. 337.* *Folia*

- lia* petiolata, ovata, ferrata, trinervia, pedalia; petiolis brevissimis. *Stipulae* oppositæ, utrinque solitariae, ovatae, obtusæ, integerrimæ. *Racemi* longitudine foliorum, paniculati, divaricati.
107. AMARANTHUS *polygonoides*. Sloan. jam. 1. t. 92. f. 2. Calycibus infundibuliformibus obtusis singularis.
108. PHARUS *latifolius*. Culmus pedalis, geniculis ad basin sæpius duobus. *Folia* maxima, longitudine culmi, obovata, acuminata, resupinata. *Petioli* folio duplo longiores, ad medium usque vaginantes. *Panicula* rarior, erecta: *Flores* feminei alterni, sessiles, remoti: pedicello masculo unifloro, juxta basin fl. feminei inserto, ejusdemque longitudine.
109. SAGITTARIA *lanceifolia*. *Folia* statura Cannæ. *Scapus* simplex, pedunculis passim ternis uti in nostrate.
100. CROTON *glabellum* 7. Brown. jam. 348. *Folia* alterna, petiolata, glabra, tenera, pellucida, subtus glauca. *Pedunculi* longiusculi. *Fructus* lævis.
- 111 CROTON *glandulosum*. Statura Croc. tinctorii. *Caulis* primo & secundo trichotomus; tertio & quarto dichotomus; demum *Spicæ* alternæ inter folia opposita, at priores ex divaricationibus caulis. *Folia* ovato-oblonga, obtusiuscula, profunde ferrata, supra scabra pilis stellatis, imprimis supra venas; subtus vero magis. *Glandula* urceolata, flava, ad basin foliorum utrinque.

112. CROTON *lucidum*. Simile *Crot. Tiglio*, sed *Folia* opposita, lanceolata, ovata, acuta, minus ferrata, minime nervosa.
113. CROTON *humile* 2. *Brown. jam. 347*. Simile *Crot. moluccano*. *Caulis* compositus. *Folia* venosa, minime supra tomentosa aut margine repanda.
114. CROTON *flavens*. *Rami* densissime tomentosi uti *Phlomis*. *Folia* cordata, oblonga, acuminata, mucronata, utrinque tomentosa. *Petioli* folio breviores. *Spicæ* in divaricationibus caulis. *Tomentum* omne constat stellulis pedicellatis.
115. ACALYPHA *virgata*. *Caulis* erectus, parum ramosus. *Folia* brevius petiolata, lato-lanceolata, acuminata, obtuse ferrata. *Spicæ* axillares, solitariae: *Masculæ* filiformes, aphyllæ; *Femineæ* distinctæ secundum totam longitudinem *Bracteis* alternis, cordatis, inciso-ferratis. Similis *Acalyphe virginicæ*, a qua differt quod altior, quod femineæ *spicæ* distinctæ a masculis, quod *Bracteæ* plures, quod *Folia* brevius petiolata.

DIOECIA.

116. CECROPIA *peltata*. *Folia* petiolata, peltata, pedata, tenera, octo-palmata: lobis integris, acutis, supra scabra, subtus tomentoso-alba, nervis oblique transversis venisque transversissimis.
117. TROPHIS *americana*. *Folia* alterna, petiolata, oblonga, integerrima, glabra. *Character* proxime accedit ad *Urticam* & *Parietariam*.

118. ADE-

118. **ADELIA** *Ricinella*. Frutex. *Folia* e singulis gemmis nonnulla ut in *Berberide*, obovata, integerrima, nuda, petiolata. *Pedunculi* ex iisdem gemmis, 2 f. 3, filiformes, nudi, uniflori. *Calyx* pubescens.
119. **ADELIA** *Acidoton*. Frutex ramis flexuosis, rigidis. *Gemma* prominula in divaricationibus & ad angulos flexurarum caulis, exterius *Spina* munita tenui. *Folia* associata ut in *Berberide*, obovata, integerrima, obtusa, nuda, parva, rigidula, venosa. *Pedunculi* ex iisdem gemmis, nonnulli, capillares, nudi, uniflori, longitudine foliorum.
120. **CLUTIA** *Cascarilla*. Croton 3. *Brown*. 347. *Ricino* affinis odorifera. *Sloan. jam. 1. t. 86. f. 1.* *Croton foliis lineari-lanceolatis glabris subtus argenteis. Mill. lex.* Frutex. *Folia* alterna, sed sparsa ad divaricationes ramorum, facie *Hippophaës*, petiolata, glabra, subtus albido-tomentosa, ad basin ipsius folii a latere superiore *Glandulae* 3, cylindricæ, elongatæ, apice, truncatæ, concavæ; an *Crotonis* species?
121. **CLUTIA** *Eluteria*. Arbor. *Folia* alterna, petiolata, ovata, obtusa, integerrima, supra adspersa squamis orbiculatis; subtus iisdem tecta. *Racemi* ramosi, axillares & terminales. *Flores* maris *Staminibus* 10, subulatis, longitudine corollæ. *Antheris* erectis, compressis. *Petala* 5, oblonga, obtusa, sessilia, patentia, quæ etiam in femina.

POLYGAMIA.

122. **MIMOSA** *tortuosa* 1. *Brown. jam. 251.* Frutex
D 3
ramis

- ramis subtomentoso-fordide cinereis. *Folia* 4-juga: *Glandula* impressa infra infimum par. *Foliola* 16-juga. *Pinnæ* obtusiusculæ, anteriore latere angustiores. *Pedunculi* 4 oppositi, axillares, tomentosi, nudi, longitudine foliorum. *Aculei* stipulares, rigidi, subpubescentes, foliis multo breviores. *Spicæ* globosæ, polyandræ floribus parvis.
123. PARIETARIA *microphylla*. *Urtica* 4. *Brown. jam. 336*. Habitus *Herniariæ*, saturate viridis. *Folia* opposita, petiolata, obovata: altero folio minore magis ovato.
124. VALANTIA *hypocarpa*. *Statura Valantiæ cruciatæ*. *Caules* herbacei, laxi, ut tota planta hispidi. *Rami* alterni. *Folia* quaterna, sessilia, oblongo-ovata. *Pedunculus* axillaris, solitarius, uniflorus, folio brevior, e singulis foliorum alis. *Calycis* foliola petiolata. *Germen* superum. *Corolla* rotata, quadripartita tubo brevi. *Stamina* 4, *Styli* 2. Alii flores solum masculi.
125. APLAUDA *zeugites*. *Culmus* ramosissimus. *Folia* ovata, brevia. *Petioli* foliis breviores, excepta vagina culmum obvestiente.
126. ANDROPOGON *insulare* differt ab *Androp. nuctante*, quod *Aristæ* desint; quod *Calyx* lanatus nec tantum pubescens; quod singuli flores proprio pedicello instruantur.
127. ANDROPOGON *barbatum* 1. *Brown. jam. 364*. *Spicæ* plurimæ, aggregatæ, terminales, secundæ, sessiles, longitudine digiti. *Flores* sessiles, alterni. *Calyx* bivalvis, inæqualis, acuminatus, glaber, brevior,

vior, biflorus. *Flosculus sessilis* prior: *Gluma* petaloidea bivalvis: valvula exteriori ciliata lana alba longitudine flosculi, apice terminata *arista* recta, longitudine flosculi. *Flosculus pedicellatus* alter minor: *Gluma* corollina bivalvi: valvula exteriori imberbi, aristata.

APENDIX.

MACROCNEMUM *jamaicense*. *Brown. jam. 165.* Frutex ramis compositis, inæqualibus. *Folia* opposita, lanceolato-ovata, subpetiolata, integerrima, lævia. *Paniculæ* trichotomæ, dichotomæ, vix foliis longiores. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, 5-dentatum. *Cor.* monopetala, infundibuliformis: *Tubus* brevis, cylindricus, fauce barbata; *Limbus* 5-partibus: laciniis patentibus, ovato-oblongis, apice incurvis. *Filamenta* 5, subulata, faucis inserta, brevissima. *Anth.* oblongæ, obtusæ. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigmata* 2, erecta. *Capsula* oblonga, inferne angustior, 2ocularis. *Sem.* plurima, imbricata.

LAETIA? *Thamnia*. *Brown. jam. 245.* Arbor. *Folia* alterna, petiolata, lanceolato-ovata, integerrima. *Racemi* axillares, sæpe 3-fidi, 3-flori, involucellis minimis. Videtur affinis *Capparidi*, sed *Perianth.* 4-phyllum, coloratum: foliolis orbiculatis, concavis, æqualibus, acutiusculis. *Cor.* O. *Stam.* *Filamenta* plurima, subulata, calyce breviora. *Anth.* ovatæ. *Germen* ovatum, desinens in *Stylum* longitudine staminum. *Stigma* crassiusculum, retusum.

Till Herr AUCTION.

I fjollig kärlek mången vågar
Sin tid, sin frihet, lif och själ,
At endast lefva annans trål:
Er eld, min Vän, förnuftigt lågar.
Ett fåfångt prål, en sminkad hy,
Ej kan Ert finnes lugn förstå;
Ty *Flora* fått Ert hjerta röra,
Som hvart år gör Er fågnad ny.



Till Er från alla världens delar
Hon ådla skatter med sig för;
Hvad finnet gladt och muntert gör;
I *Hennes* sällskap aldrig felar:
Hur kär *Hon* har Er Dygde-glans,
Hos lärda Verlden kunnigt blifver,
När genom Er *Hon* honom gifver
En tåck *Jamaicas* Örte-Krans.

ANDERS RYDEN.